



***Zajímavosti ze světa makromycet s důrazem na  
jejich výskyt pod introdukovanými dřevinami***

Svět hub je velice pestrý a houby (makromycety) jsou nedílnou součástí našich lesů a poměrně dost druhů roste i pod introdukovanými dřevinami.



Nejrůznorodější druhová skladba hub je pod Dubem červeným, pod kterým rostou i chráněných druhy.



# Xaverovský háj




Počet jedinců hříba plavého na celé ploše bylo několik set.



## Hřib rubínový – jen několik lokalit v České republice






Naopak hodně chudá druhová skladba se nachází pod trnovníkem akátem. Akát je hodně agresivní dřevina ve vztahu k makromycetům a roste pod ní jen několik málo druhů. Druhová skladba makromycetů je hodně chudá pod dalšími dřevinami jako je borovice vejmutovka a zřejmě i smrk pichlavý.

Na modřín opadavý jsou vázány oblíbené druhy mykorhizních hub, jako jsou klouzci, především klouzek sličný – *Suillus grevillei* a také klouzek slizký – *Suillus viscidus*. Na výzkumné ploše – monokultura modřínu, nerostlo prakticky nic.



Zajímavý, je také hřib dutonohý – *Boletus cavipes*, lidový název je dutonožka. Na modřín je také vázána šťavnatka modřínová – *Hygrophorus lucorum*, která roste v listopadu a v prosinci, tedy v období ve kterém roste jen minimum jedlých hub.





Douglaska tisolistá roste většinou v příměsi našich původních dřevin a rostou pod ní běžné druhy hub. Pod borovice černou rostou podobné druhy hub jako pod borovici lesní.

V čistém porostu na výzkumné ploše s jedlí obrovskou byla zjištěna bohatá skladba hub. Různé druhy holubinek, ryzců, pavučinatců, penízovek a také hříbovité houby. U hříbovitých hub mohou můžeme občas najít srostlice. Hřib smrkový je jedna z nejoblíbenějších hub a roste v jehličnatém i listnatém lese.



## Srostlice vzácného hříba borového – *Boletus pinophilus*



Hřib borový obvykle roste pod borovicí lesní, ale může vyrůst i v čistých starších bukových porostech. Krasavec a zasluhuje ochranu.



Letošní další objevená lokalita ve Voděradských bučinách



Muchomůrka císařská  
Slovensko



Hřib Le Galové  
Srbsko



## Korálovec bukový – *Hericium clathroides*



Ještě se nezačala zelenat tráva a už rostou první velmi chutné jarní houby.  
Co to je za druh ?



## Kačenka česká – *Verpa bohemica*



Doba růstu – od poloviny března do začátku května. Roste jen na zásaditém podloží, tedy Český kras, Moravský kras, České středohoří...atd



Vetřelec z jiné planety – Květnatec archerův (nepůvodní druh)  
Domovinou je Austrálie – Tasmanie, v Evropě poprvé 1914 ve Francii



Houbařina to je dřina



Velké hříby je lepší nechat v lese



Tenhle člověk musí  
být úplný magor.

